















Tjek Baby – Sådan kan I se, at baby får nok mælk

Gælder for børn født fra graviditetsuge 37

DEN FØRSTE TID

- med baby

Alder	Uge 1							Uge 2-4
	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7	
Mælk Antal amninger i døgnet	Mindst 4-5 amninger 		Mindst 8 amninger i døgnet – gerne mere 					
Tissebleer Gennemsnittet over 24 timer	1 tisseble 	2 tissebleer 	3 tissebleer – føles tungere 	5 tunge tissebleer 	6 tunge tissebleer 			
Afføringsbleer Gennemsnittet over 24 timer	1 afføringsble 		2 afføringsbleer 	4 afføringsbleer 				
Afføring Farve og konsistens	Sort, brun eller mørk grøn afføring – klistret og tyktflydende 		Lysere og mere grønlig afføring 		Gullig/grøn afføring 		Gul afføring og syrlig lugt. Blød konsistens – kan være grynet 	

Trivsel

Andre tegn der viser, at barnet trives:

- Interesseret i at spise
- Vågen og opmærksom i korte perioder fx. ved bleskift
- Veltilpas og kan beroliges ved tæt kontakt
- Normal hudfarve, ikke grå eller bleg.

Det er normalt, at barnet:

- Får lidt gulfarvning af huden efter 1. døgn (gulstøt)
- Taber sig efter fødslen, og kommer tilbage på fødselsvægten i løbet af de første 2 uger.

Tegn på at ville spise

Tidlige tegn:

- Suttebevægelser med mund og tunge
- Bevægelser med arme og ben
- Søgen efter brystet, fingre til mund.

Senere tegn:

- Uro og klynkelyde
- Gråd ind i mellem eller konstant
- Udmattelse og søvn.

Det er en fordel, at barnet lægges til brystet allerede ved de tidlige tegn.

Hud mod hud

Hud mod hud-kontakt med barnet er særlig vigtig i de første dage, hvor barnet omstiller sig fra livet i livmoderen til livet udenfor.

Fordele ved hud mod hud-kontakt:

- Barnet spiser oftere
- Barnet græder mindre og bruger mindre energi
- Barnet har mere stabil temperatur
- Det hjælper jer til at opdage babys signaler
- Stimulerer mors mælkenedløb.

Vær ekstra opmærksom, hvis barnet ...

Det kan I gøre

Mælk

- Ammes mindre end 4-5 gange i det første døgn eller mindre end 8 gange derefter.

- Læg barnet hyppigere til, gerne 10-12 gange i døgn
- Forsøg at fremme barnets søge- og sutrefleks ved at have barnet hud mod hud ved brystet
- Sørg for at skabe ro omkring jer
- Forsøg at presse lidt mælk ud til barnet
- Øg mælkeproduktionen ved at håndudmalke.

Tissebleer

- Ikke har tisset indenfor de første 24 timer
- Tisser mindre end beskrevet i skemaet
- Orange pletter i bleen efter 3. dag (urater).

- Læg barnet hyppigere til, gerne 10-12 gange i døgn
- Læg barnet til begge bryster under hver amning
- Sikre, at barnet sutter aktivt, vedvarende og I hører synkelyde
- Opsøg gerne råd og vejledning hos sundhedspersonale.

Afføringsbleer

- Ikke har haft afføring indenfor de første 24 timer
- Har færre afføringer eller afføringen har en anden farve end beskrevet i skemaet.

- Læg barnet hyppigere til, gerne 10-12 gange i døgn
- Læg barnet til begge bryster under hver amning
- Sikre, at barnet sutter aktivt, vedvarende og at I hører synkelyde
- Opsøg gerne råd og vejledning hos sundhedspersonale.

Trivsel

- Er vedvarende urolig og grædende – er svært at trøste
- Viser tegn på ikke at have det godt. Ikke interesseret i at spise.

- Forsøg at opfylde barnets behov for mad, bleskift, søvn, ro, tæt kontakt
- Søg råd og vejledning hos sundhedsplejersken, som sammen med jer vil forsøge at finde forklaringer.

Gulsof

- Bliver gult indenfor de første 24 timer
- Bliver gult, når det er mere end 24 timer, men vågner selv til måltiderne og spiser aktivt
- Bliver gult, når det er mere end 24 timer gammelt samtidigt med, at det er sløvt. Skal vækkes til måltider og/eller hurtigt falder i søvn under måltidet
- Er barnet stadig gult, når det er 14 dage gammelt eller ældre.

• VIGTIGT – Kontakt fødestedet straks

- Læg barnet hyppigere til, gerne 10 gange i døgn eller mere
- Opsøg råd og vejledning hos sundhedsplejersken, fødestedet eller egen læge
- Opsøg råd og vejledning hos sundhedsplejersken eller egen læge.

Her kan I få hjælp

- Fødested
- Sundhedsplejersken
- Jeres egen læge
- Vagtlæge

